Hoja de recuento extendida del paciente

Datos del profesional de la salud y la consulta									
ID Centro de salud (pre-impreso)								prov.id	
Fecha de la consulta		/			/	(D	D / MM / YYYY)	date.day date.month date.year	
Datos del paciente									
Sexo	_ 1-	☐ 1 – Masculino ☐ 2 – Femenino ☐ 3 – Otro						Sex	
Edad		años						age	
	_ Primaria _		2 – Primaria completa	Primaria		4 – Bachilleration			
Mayor nivel de educación			6 – Universitario/ Especialización/ maestría		7 – □ Universita	rio			
Pregunta previa al tamizaje									
¿Le han preguntado sobre su consumo de alcohol en una cita en el último año? $1 - Si$ $2 - No$								No lastyear	

Si NO, aplique AUDIT - C Tamizaje de alcohol. Si SÍ, termine el tamizaje de alcohol aquí, no hay necesidad de volver a preguntar. PASE al tamizaje de depresión PHQ2.

AUDIT-C Tamizaje de Alcohol

- Lea las preguntas como están escritas y registre las respuestas cuidadosamente.
- Comience el AUDIT diciendo: "Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre el consumo de bebidas alcohólicas durante los últimos tres meses".
- Explique lo que se entiende por "trago estándar" usando ejemplos locales de cerveza, vino, aguardiente, ron, etc Las bebidas alcohólicas contienen diferentes concentraciones de alcohol, por ejemplo, un vaso lleno de brandy contiene más alcohol que un vaso lleno de cerveza. Lo que llamamos "trago estándar" es una bebida que contiene 12 gramos de alcohol. Como se muestra en la gráfica, un trago estándar es equivalente a: un vaso de cerveza, una copa pequeña (shot) de brandy o whisky, una copa pequeña de aguardiente, una copa mediana de vino.

	30ml	30ml	30)ml	125ml	330ml Lata de	250ml
	Copa de destillados	Copa de	Copa de	destilados	Copa de vino	cerveza	Botella de
	(40%) e.j. Ron, Whisky	Aguardiente (32%)	(40%) e.j. F	Ron, Whisky	(12%)	^	cerveza
1 Trago estándar							
	60 ml	60ml		•	to con 60 ml de		Coctel
	Vaso de destilados (40%)	, ,		destillados (40	%) e.j. Ron, Whis	ky 🧲	
2 Tuonos	Ron, Whisky	(32%)			\cong		
2 Tragos estándar				Į		_	

Codifique las respuestas en términos de bebidas estándar. Ubique el número de la respuesta correcta en el cuadro de la derecha

		D					
	0	0 1 2 3		3	4	Puntaje	
¿Con qué frecuencia toma una bebida que contiene alcohol?	Nunca	Una vez al mes o menos	De 2 a 4 veces al mes	De 2 a 3 veces por semana	4 o más veces por semana		
¿Cuántas bebidas alcohólicas 2 estándar toma en un día típico en el que está bebiendo?	1-2	3-4	5-6	7-9	10+		
¿Con qué frecuencia toma 6 o 3 más tragos estándar en una ocasión?	Nunca	Menos de una vez al mes	Cada mes	Cada semana	Diariamente o casi diaria- mente		

Qué hacer a continuación

Si el puntaje de AUDIT-C es ≥ 8 → Aplique el cuestionario restante de AUDIT.

Puntuación total AUDIT-C (rango posible 0-12)



auditc.sum

audit1

audit2

audit3

AUDIT - 10 (Escala restante)

		Sistema de puntuación					
	0	1	2	3	4	Puntaje	
¿Con qué frecuencia en el último año se ha dado cuenta de que no era capaz de dejar de beber una vez que había empezado?	Nunca	Menos de una vez al mes	Cada mes	Cada semana	Diariamente o casi diariamente		
¿Con qué frecuencia en el último año ha fallado en hacer lo que se esperaba de usted debido a la bebida?	Nunca	Menos de una vez al mes	Cada mes	Cada semana	Diariamente o casi diariamente		
¿Con qué frecuencia en el último año ha necesitado una bebida 6 alcohólica en la mañana para ponerse en marcha?	Nunca	Menos de una vez al mes	Cada mes	Cada semana	Diariamente o casi diariamente		
¿Con qué frecuencia en el último año ha tenido un sentimiento de culpa o arrepentimiento después de beber?	Nunca	Menos de una vez al mes	Cada mes	Cada semana	Diariamente o casi diariamente		
¿Con qué frecuencia en el último año no ha sido capaz de recordar lo que sucedió cuando bebió la noche anterior?	Nunca	Menos de una vez al mes	Cada mes	Cada semana	Diariamente o casi diariamente		
¿Ha sufrido usted u otra persona 9 alguna lesión como resultado de su consumo de alcohol?	No		Sí, pero no en el último año		Sí, durante el último año		
¿Un pariente/amigo/doctor/trabajador 10 de la salud se ha preocupado por su consumo de alcohol o le ha aconsejado que lo reduzca?	No		Sí, pero no en el último año		Sí, durante el último año		

Puntaje total AUDIT-10 (rango posible 0-40)



Ahora pase al tamizaje de depresión PHQ2

Pre- Screen Question

Question			
	1 – Yes	2 – No	
¿Le han hecho preguntas sobre depresión en alguna cita en el último año?			Last year.dep
Si NO, aplique el tamizaje de depresión PHQ2.	Si SÍ, no necesita tan	nizar otra vez.	

PHQ-2 Tamizaje de depresión

En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado alguno de los siguientes problemas?								
		Nunca	nca Varios Más de la mi días de los días		Casi todos los días	Puntaje		
1	Poco interés o placer en hacer las cosas.	0	1	2	3			
2	Sentirse deprimido o desesperanzado.	0	1	2	3			

phq1

phq2

Qué hacer a continuación

Si la puntuación de PHQ-2 es ≥ 3 → Aplique el cuestionario de PHQ restante

Puntuación total PHQ-2 (rango posible 0-6)



phq2.sum

PHQ-9 (Escala restante)

En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado alguno de los siguientes problemas?						
		Nunca	Varios días	Más de la mitad de los días	Casi todos los días	Puntaje
≺ .	Dificultad para quedarse dormido o dormir demasiado	0	1	2	3	
4	Sentirse cansado o tener poca energía.	0	1	2	3	
5 1	Pobre apetito o comer en exceso	0	1	2	3	
6	Sentirse mal consigo mismo o por ser un fracaso o haberse decepcionado a usted mismo o a su familia	0	1	2	3	
7 (Problemas para concentrarse en cosas, como leer el periódico o mirar la televisión	0	1	2	3	
8 8 9	Moverse o hablar tan lentamente que otras personas podrían haberse dado cuenta. O lo opuesto es que está tan seguro o inquieto que se ha estado moviendo mucho más de lo habitual.	0	1	2	3	
9 1	Pensamientos de que estaría mejor muerto, o de hacerse daño	0	1	2	3	

Qué hacer a continuación

Si la puntuación de PHQ-9 ≥ 15 → Deténgase y considere si referir a servicio especializado de tratamiento de depresión es apropiado

Si la puntuación de la pregunta 9 del PHQ-9 es ≥2 → Deténgase y considere si el monitoreo del paciente o la remisión a servicios especializados para el riesgo de suicidio son apropiados

Puntaje total de las preguntas 3-9 (rango posible 0-21)

SCORE

phq6.sum

Puntaje total completo PHQ-9 (rango posible 0-27)

phq9.sum

Registro del consejo breve o remisión

(Para completar al final de la consulta)

Coı	nsejo Breve y Remisión (más de una es pos	sible)]
[]	1 – Consejo breve para reducir el consumo de alcohol	[]	2 – Folleto sobre alcohol entregado al paciente	document1/2
	3 – Se ofreció al paciente, pero rechazó el folleto sobre el alcohol	[]	4 – Monitoreo continuo	document3/4
	5 – Paciente remitido a otro proveedor en la práctica por un consejo breve para reducir el consumo de alcohol	[]	6 – Paciente remitido a otro proveedor fuera de la práctica para recibir consejo breve para reducir el consumo de alcohol	document5/6
[]	7 – Folleto sobre depresión entregado al paciente	[]	8 – Se ofreció al paciente, pero rechazó el folleto sobre depresión	document7/8
	9 – Paciente remitido a servicio especializado de alcohol.	[]	10 – Paciente remitido al servicio especializado para la depresión / riesgo de suicidio	document9/10
	11 – Otro			document11/ document11. Other
	12 – El tiempo no lo permitió, pero 13 – Hice cita de seguimiento	[]	14 - El paciente rechazó un breve consejo para reducir el consumo de alcohol	document12- document14
	caso de que se proporcionara un consejo posible más de una respuesta)	brev	re, ¿qué partes se incluyeron?	
	1 – Proporcionó comentarios personalizados sobre el consumo de alcohol	[]	2 – Responsabilidad asignada al paciente	advice1/2
[]	3 – Entregó el folleto del paciente	[]	4 – Explicó qué es el consumo de bajo riesgo	advice3/4
[]	5 – Explicó el consumo de alto riesgo	[]	6 – Bebidas estándar explicadas	advice5/6
[]	7 – Explicó los efectos del alcohol sobre la salud	[]	8 – Explicó los efectos sociales del alcohol.	advice7/8
	9 – Explicó que la mayoría de las personas son bebedores de bajo riesgo / abstinentes	[]	10 – Explicó los beneficios de reducir el consumo de alcohol	advice9/10
	11 – Fueron explicadas las formas de reducir el consumo de alcohol	[]	12 – Ayudó a establecer un objetivo	advice11/12
[]	13 – Introdujo un diario de bebidas	[]	14 – Autoeficacia reforzada	advice13/14
	15 – Apoyo identificado	[]	16 – Se aconseja reducir el consumo de alcohol	advice15/16
	17 – Aportó ideas de cómo reducir el consumo de a	alcoho	ol	advice17