

Prevención y manejo de trastornos por uso de alcohol y depresión comórbida

Protocolo



Ruta de atención

Todos los pacientes adultos (hombres y mujeres) que visitan el centro, serán tamizados con el AUDIT-C y PHQ-2


TAMIZAJE DE ALCOHOL CON EL AUDIT-C + TAMIZAJE DE DEPRESIÓN CON EL PHQ-2

Tamizaje

Evaluación del riesgo

Jucio Clínico

Intervención



Tamizaje del consumo de alcohol

Se recomienda completar el tamizaje de consumo de alcohol con todos los usuarios adultos (mayores de 18 años). Si un usuario ha completado el tamizaje no hay necesidad de repetirlo, a menos que usted o un colega hayan recomendado un monitoreo continuo del consumo de alcohol.

AUDIT C

Esta herramienta de tres preguntas debe utilizarse con todos los usuarios adultos.

- Si el usuario puntúa 0-7, debe recibir retroalimentación positiva sobre su estado de consumo de riesgo bajo y una copia del folleto para usuarios 'Mi relación con la bebida'.
 - Si el usuario puntúa 8 o más en el AUDIT -C, le debe proporcionar algunos minutos de consejo breve verbal y entregar el folleto del usuario para que se lo lleve.
- Si usted está preocupado de que el paciente pueda ser dependiente del alcohol y pueda necesitar más apoyo debido a su consumo, utilice su criterio clínico para determinar si es apropiado remitirlo a un servicio especializado de tratamiento para el consumo de alcohol.

Tamizaje de la depresión

Se recomienda completar el tamizaje de depresión con todos los usuarios adultos (mayores de 18 años). Si un usuario ha completado el tamizaje no hay necesidad de repetirlo, a menos que usted o un colega hayan recomendado un monitoreo continuo de la depresión.

PHQ-2

Complete las dos preguntas del PHQ – 2 con el usuario.

Si el usuario puntúa **3 o más**, debe recibir una copia del folleto ‘Manejo personal del bajo estado de ánimo y la depresión’ y ser evaluado por riesgo de suicidio.

Si el usuario puntúa **0-2**, no necesita más evaluación, pero sí debería recibir retroalimentación sobre su estado de depresión actual.

Si usted está preocupado de que el paciente pueda necesitar más ayuda y apoyo por depresión o pueda estar en riesgo de suicidio, use su criterio clínico para evaluar si el usuario requiere ser remitido a servicios especializados.

Tamizaje del riesgo de suicidio

Los usuarios que obtengan un puntaje de 3 o más en el PHQ2 deben ser evaluados por riesgo de suicidio con la siguiente pregunta :

“Durante las dos últimas semanas, ¿qué tan seguido lo han molestado pensamientos relacionados con que estaría mejor muerto, o con lastimarse a sí mismo?”

Si el paciente obtiene puntaje 0 (Respuesta: ‘Nunca’) en esta pregunta, no es probable que presente riesgo suicida. No se requiere hacer nada más respecto a riesgo de suicidio.

Si el paciente obtiene puntaje 1 (Respuesta ‘Varios Días’) en esta pregunta, podría tener un riesgo bajo de suicidio. Usted debe utilizar su criterio clínico para decidir si debe monitorear al paciente. Si el paciente se mantiene estable con un puntaje de 1 en esta pregunta se le pueden dar los folletos de SCALA (Según lo indiquen los puntajes de los tamizajes).

Si el paciente obtiene puntaje 2-3 en esta pregunta podría presentar riesgo de suicidio. Utilice su criterio clínico para determinar si es apropiado remitirlo a un servicio especializado de apoyo o si el y monitoreo es adecuado.