

Hoja de recuento muy corta

Detalles del profesional de la salud and la consulta

ID Profesional (pre-impreso) _____		<i>prov.id</i>
Fecha de consulta ____ / ____ / ____ (DD / MM / YY)		<i>date.day/ date.month/ date.year</i>
Lugar de trabajo <input type="checkbox"/> 1 – clinica <input type="checkbox"/> 2 – casa	Tipo de consulta	<input type="checkbox"/> 1 – cara a cara <input type="checkbox"/> 2 – teléfono celular <i>type.consult</i>

Detalles del paciente

Sexo <input type="checkbox"/> 1 – Masculino <input type="checkbox"/> 2 – Femenino <input type="checkbox"/> 3 – Otro	Edad _____ años	<i>sex/age</i>
Educación <input type="checkbox"/> 1 – Menos que el bachillerato <input type="checkbox"/> 2 – Bachillerato <input type="checkbox"/> 3 – Cualquier educación más allá del bachillerato		<i>education</i>

Pregunta previa al tamizaje





Pregunta	1 – Si	2 – No	<i>lastyear</i>
¿Le han preguntado sobre su consumo de alcohol en una cita en el último año?			
Si NO, aplique AUDIT - C Tamizaje de alcohol. Si SÍ termina aquí, no hay necesidad de volver a seleccionar. PASAR a la prueba de detección de depresión PHQ2.			

Hoja de recuento muy corta

AUDIT-C Tamizaje de alcohol

- Lea las preguntas como están escritas y registre las respuestas cuidadosamente.
- Comience la AUDITORÍA diciendo: "Ahora le haré algunas preguntas sobre su consumo de bebidas estándar de bebidas alcohólicas durante el año pasado".
- Explique qué se entiende por "tragos estándar" utilizando ejemplos locales de cerveza, vino, vodka, etc.

Las bebidas alcohólicas contienen diferentes concentraciones de alcohol, por ejemplo un vaso lleno de brandy contiene más alcohol que un vaso lleno de cerveza. Lo que llamamos "trago estándar" es una bebida que contiene 12 gramos de alcohol. Como se muestra en la gráfica, un trago estándar es equivalente a: un vaso de cerveza, una copa pequeña (shot) de brandy o whisky, una copa pequeña de aguardiente, una copa mediana de vino.

1 Standard Drink:	250ml Beer (5%) 	100ml Wine (12%) 	30ml Spirits (40%) 	30ml Spirits (40%) 
----------------------------------	---	--	---	--

- Codifique las respuestas en términos de bebidas estándar. Ubique el número de la respuesta correcta en el cuadro de la derecha

Preguntas	0	1	2	3	4	Puntaje	
1 ¿Con qué frecuencia toma una bebida que contiene alcohol?	Nunca	Una vez al mes o menos	De 2 a 4 veces al mes	De 2 a 3 veces por semana	4 o más veces por semana		<i>audit1</i>
2 ¿Cuántas bebidas alcohólicas estándar toma en un día típico en el que está bebiendo?	1-2	3-4	5-6	7-9	10+		<i>audit2</i>
3 ¿Con qué frecuencia toma 6 o más tragos estándar en una ocasión?	Nunca	Menos de una vez al mes	Cada mes	Cada semana	Diariamente o casi diariamente		<i>audit3</i>
Puntuación total AUDIT-C (rango posible 0-12)						__	<i>audtc.sum</i>
Si puntuación AUDIT-C ≥ 8 Brindar un asesoramiento breve y / o use su criterio clínico para considerar si la remisión a servicios especializados es apropiada. Aplicar el cuestionario PHQ-2 y la detección del riesgo de suicidio.							

Hoja de recuento muy corta

Antes de realizar el tamizaje preguntar al usuario:

Question	1 – Sí	2 – No
¿Algún profesional le ha preguntado acerca de su depresión durante el último año?		
Si la respuesta es NO, aplique la Prueba de detección de depresión PHQ2. Si Sí termina aquí, no es necesario volver a realizar la prueba.		

Lastyear.dep

PHQ-2 Tamizaje de depresión

En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado alguno de los siguientes problemas?				
	No en absoluto	Varios días	Más de la mitad de los días	Casi todos los días
1 Poco interés o placer en hacer las cosas.	0	1	2	3
2 Sentirse deprimido, deprimido o desesperanzado.	0	1	2	3
Puntuación total (rango posible 0-6)				
Si la puntuación PHQ-2 es ≥ 3				
Dar un folleto informativo para la depresión y / o utilice su criterio clínico para considerar si es apropiado derivarlo a servicios especializados en el tratamiento de la depresión.				

phq1

phq2

phq2.sum

Tamizaje para riesgo de suicidio

En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado alguno de los siguientes problemas?				
	No en absoluto	Varios días	Más de la mitad de los días	Casi todos los días
1 Pensamientos de que estaría mejor muerto, o de hacerse daño	0	1	2	3
Puntuación IF ≥ 2				
Deténgase y considere si el monitoreo del paciente o la remisión a servicios especializados para el riesgo de suicidio son apropiados				

suicide

Tomando registro del consejo breve y remisiones

Consejo breve y remisión <i>(más de una es posible)</i>	<input type="checkbox"/> 1 - Consejo breve para reducir el consumo de alcohol dado
	<input type="checkbox"/> 2 – Folleto paciente entregado sobre el alcohol
	<input type="checkbox"/> 3 – Se ofertó al paciente, pero rechazó el folleto sobre el alcohol
	<input type="checkbox"/> 4 - Monitoreo continuo
	<input type="checkbox"/> 5 - Paciente remitido a otro proveedor en la práctica por un consejo breve para reducir el consumo de alcohol
	<input type="checkbox"/> 6 - Paciente remitido a otro proveedor fuera de la práctica para recibir consejo breve para reducir el consumo de alcohol
	<input type="checkbox"/> 7 – Folleto entregado al paciente sobre la depresión
	<input type="checkbox"/> 8 – Se ofreció al paciente, pero rechazó el folleto sobre la depresión
	<input type="checkbox"/> 9 - Paciente referido a servicio especializado de alcohol.
	<input type="checkbox"/> 0 - Paciente referido al servicio especializado para la depresión / riesgo de suicidio
	<input type="checkbox"/> 11 - Otro
	<hr/>
	<input type="checkbox"/> 12 - El tiempo no lo permitió, pero
	<input type="checkbox"/> 13 - hice cita de seguimiento
<input type="checkbox"/> 14 - El paciente rechazó un breve consejo para reducir el consumo de alcohol	

*document1-14/
document11.other*